Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du Bac Général Maths + Physique, veuillez visiter :
bac-maths-physique.fr/annales-sujets-et-corriges

Baccalauréat Métropole 11 septembre 2023

Sujet 1

ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

EXERCICE 1 **4 points**

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples.
Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte.
Une réponse exacte rapporte un point. Une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse à une question ne rapporte ni n'enlève de point.
Pour répondre, indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre de la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée.

1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x\mathrm{e}^{x^2-3}.$$

Une des primitives F de la fonction f sur $\mathbb{R}$ est définie par :

a. $F(x) = 2x\mathrm{e}^{x^2-3}$ **b.** $F(x) = \left(2x^2+1\right)\mathrm{e}^{x^2-3}$

c. $F(x) = \dfrac{1}{2}x\mathrm{e}^{x^2-3}$ **d.** $F(x) = \dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{x^2-3}$

2. On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$u_n = \mathrm{e}^{2n+1}.$$

La suite (u_n) est :

a. arithmétique de raison 2 ; **b.** géométrique de raison e ;

c. géométrique de raison e^2 ; **d.** convergente vers e.

Pour les questions **3.** et **4.**, on considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par :

$$u_0 = 15 \quad \text{et pour tout entier naturel } n \quad : u_{n+1} = 1,2u_n + 12.$$

3. La fonction Python suivante, dont la ligne 4 est incomplète, doit renvoyer la plus petite valeur de l'entier n telle que $u_n > 10\,000$.

```
def seuil() :
    n=0
    u=15
    while ......:
      n=n+1
      u=1,2*u+12
    return(n)
```

À la ligne 4, on complète par :

a. u$\leqslant 10\,000$; **b.** u $= 10\,000$ **c.** u$> 10\,000$; **d.** $n \leqslant 10\,000$.

4. On considère la suite (v_n) définie sur $\mathbb{N}$ par : $v_n = u_n + 60$.
La suite (v_n) est :

a. une suite décroissante ; **b.** une suite géométrique de raison 1,2 ;
c. une suite arithmétique de raison 60 ; **d.** une suite ni géométrique ni arithmétique.

EXERCICE 2 **5 points**

L'espace est rapporté à un repère orthonormé $\left(\text{O} ; \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k}\right)$.
On considère les points

$$\text{A}(1 ; 0 ; -1), \quad \text{B}(3 ; -1 ; 2), \quad \text{C}(2 ; -2 ; -1) \quad \text{et} \quad \text{D}(4 ; -1 ; -2).$$

On note Δ la droite de représentation paramétrique

$$\begin{cases} x &= 0 \\ y &= 2+t \\ z &= -1+t \end{cases}, \text{ avec } t \in \mathbb{R}.$$

1. **a.** Montrer que les points A, B et C définissent un plan que l'on notera $\mathscr{P}$.
b. Montrer que la droite (CD) est orthogonale au plan $\mathscr{P}$.
Sur le plan $\mathscr{P}$, que représente le point C par rapport à D ?
c. Montrer qu'une équation cartésienne du plan $\mathscr{P}$ est : $2x + y - z - 3 = 0$.

2. **a.** Calculer la distance CD.
b. Existe-t-il un point M du plan $\mathscr{P}$ différent de C vérifiant MD $= \sqrt{6}$? Justifier la réponse.

3. **a.** Montrer que la droite Δ est incluse dans le plan $\mathscr{P}$.
Soit H le projeté orthogonal du point D sur la droite Δ.
b. Montrer que H est le point de Δ associé à la valeur $t = -2$ dans la représentation paramétrique de Δ donnée ci-dessus.
c. En déduire la distance du point D à la droite Δ.

EXERCICE 3 **4 points**

*Les parties **A** et **B** sont indépendantes.*
Les probabilités demandées seront données à 10^{-3} *près.*
Pour aider à la détection de certaines allergies, on peut procéder à un test sanguin dont le résultat est soit positif, soit négatif.
Dans une population, ce test donne les résultats suivants :

- Si un individu est allergique, le test est positif dans 97 % des cas ;
- Si un individu n'est pas allergique, le test est négatif dans 95,7 % des cas.


Par ailleurs, 20 % des individus de la population concernée présentent un test positif.
On choisit au hasard un individu dans la population, et on note :

- A l'évènement « l'individu est allergique » ;
- T l'évènement « l'individu présente un test positif ».

On notera $\overline{A}$ et $\overline{T}$ les évènements contraires de A et T. On appelle par ailleurs x la probabilité de l'évènement A : $x = p(A)$.

Partie A

1. Reproduire et compléter l'arbre ci-contre décrivant la situation, en indiquant sur chaque branche la probabilité correspondante.



2. **a.** Démontrer l'égalité : $p(T) = 0,927x + 0,043$.

b. En déduire la probabilité que l'individu choisi soit allergique.

3. Justifier par un calcul l'affirmation suivante :

« Si le test d'un individu choisi au hasard est positif, il y a plus de 80 % de chances que cet individu soit allergique ».

Partie B

On réalise une enquête sur les allergies dans une ville en interrogeant 150 habitants choisis au hasard, et on admet que ce choix se ramène à des tirages successifs indépendants avec remise.
On sait que la probabilité qu'un habitant choisi au hasard dans cette ville soit allergique est égale à 0,08.
On note X la variable aléatoire qui à un échantillon de 150 habitants choisis au hasard associe le nombre de personnes allergiques dans cet échantillon.

1. Quelle est la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire X ?

Préciser ses paramètres.

2. Déterminer la probabilité que 20 personnes exactement parmi les 150 interrogées soient allergiques.

3. Déterminer la probabilité qu'au moins 10 % des personnes parmi les 150 interrogées soient allergiques.

EXERCICE 4 **7 points**

PARTIE A

On définit sur l'intervalle $]0\,;\,+\infty[$ la fonction g par :

$$g(x) = \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} + \ln x \quad \text{où ln désigne la fonction logarithme népérien.}$$

On admet que la fonction g est dérivable sur $]0\,;\,+\infty[= I$ et on note g' sa fonction dérivée.

1. Montrer que pour $x > 0$, le signe de $g'(x)$ est celui du trinôme du second degré $\left(x^2 - 2x + 2\right)$.

2. En déduire que la fonction g est strictement croissante sur $]0\,;\,+\infty[$.

3. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution sur l'intervalle $[0{,}5\,;\,1]$, que l'on notera α.

4. On donne le tableau de signes de g sur l'intervalle $]0\,;\,+\infty[= I$:

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

Justifier ce tableau de signes à l'aide des résultats obtenus aux questions précédentes.

PARTIE B

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0\,;\,+\infty[= I$ par :

$$f(x) = \mathrm{e}^x \ln x.$$

On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé.

1. On admet que la fonction f est deux fois dérivable sur $]0\,;\,+\infty[$, on note f' sa fonction dérivée, f'' sa fonction dérivée seconde et on admet que :

pour tout nombre réel $x > 0$, $f'(x) = \mathrm{e}^x \left(\dfrac{1}{x} + \ln x\right)$.

Démontrer que, pour tout nombre réel $x > 0$, on a : $f''(x) = \mathrm{e}^x \left(\dfrac{2}{x} - \dfrac{1}{x^2} + \ln x\right)$.

2. On pourra remarquer que pour tout réel $x > 0$, $f''(x) = \mathrm{e}^x \times g(x)$, où g désigne la fonction étudiée dans la partie A.

3. **a.** Dresser le tableau de signes de la fonction f'' sur $]0\,;\,+\infty[$. Justifier.

b. Justifier que la courbe $\mathscr{C}_f$ admet un unique point d'inflexion A.

c. Étudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle $]0\,;\,+\infty[$. Justifier.

4. **a.** Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.

b. Montrer que $f'(\alpha) = \dfrac{\mathrm{e}^\alpha}{\alpha^2}(1-\alpha)$.

On rappelle que α est l'unique solution de l'équation $g(x) = 0$.

c. Démontrer que $f'(\alpha) > 0$ et en déduire le signe de $f'(x)$ pour x appartenant à $]0\,;\,+\infty[$.

d. En déduire le tableau de variations complet de la fonction f sur $]0\,;\,+\infty[$.

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.