Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du Bac Général Maths + Physique, veuillez visiter :
bac-maths-physique.fr/annales-sujets-et-corriges

# Baccalauréat Métropole et La Réunion – 12 septembre 2023

## Sujet 2

## ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

**EXERCICE 1** **5 points**

La paratuberculose est une maladie digestive infectieuse qui touche les vaches. Elle est due à la présence d'une bactérie dans l'intestin de la vache.
On réalise une étude dans une région dont 0,4 % de la population de vaches est infectée.
Il existe un test qui met en évidence la réaction immunitaire de l'organisme infecté par la bactérie.
Le résultat de ce test peut être soit « positif », soit « négatif ».
On choisit une vache au hasard dans la région.
Compte tenu des caractéristiques du test, on sait que :

— Si la vache est atteinte par l'infection, la probabilité que son test soit positif est de 0,992 ;

— Si la vache n'est pas atteinte par l'infection, la probabilité que son test soit négatif est de 0,984 .

On désigne par :

— $I$ l'évènement « la vache est atteinte par l'infection » ;


— $T$ l'évènement « la vache présente un test positif ».

On note $\overline{I}$ l'évènement contraire de $I$ et $\overline{T}$ l'évènement contraire de $T$.

**Les parties A et B sont indépendantes.**

**Partie A**

**1.** Reproduire et compléter l'arbre pondéré ci-dessous modélisant la situation.




**2.** **a.** Calculer la probabilité que la vache ne soit pas atteinte par l'infection et que son test soit négatif. On donnera le résultat à $10^{-3}$ près.

**b.** Montrer que la probabilité, à $10^{-3}$ près, que la vache présente un test positif est environ égale à 0,020.

**c.** La « valeur prédictive positive du test » est la probabilité que la vache soit atteinte par l'infection sachant que son test est positif. Calculer la valeur prédictive positive de ce test. On donnera le résultat à $10^{-3}$ près.

**d.** Le test donne une information erronée sur l'état de santé de la vache lorsque la vache n'est pas infectée et présente un résultat positif au test ou lorsque la vache est infectée et présente un résultat négatif au test.

Calculer la probabilité que ce test donne une information erronée sur l'état de santé de la vache. On donnera un résultat à $10^{-3}$ près.

**Partie B**

**3.** Lorsqu'on choisit au hasard dans la région un échantillon de 100 vaches, on assimile ce choix à un tirage avec remise.

On rappelle que, pour une vache choisie au hasard dans la région, la probabilité que le test soit positif est égale à 0,02.

On note $X$ la variable aléatoire qui à un échantillon de 100 vaches de la région choisies au hasard associe le nombre de vaches présentant un test positif dans cet échantillon.

**a.** Quelle est la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire $X$ ? Justifier la réponse et préciser les paramètres de cette loi.

**b.** Calculer la probabilité que dans un échantillon de 100 vaches, il y ait exactement 3 vaches présentant un test positif. On donnera un résultat à $10^{-3}$ près.

**c.** Calculer la probabilité que dans un échantillon de 100 vaches, il y ait au plus 3 vaches présentant un test positif. On donnera un résultat à $10^{-3}$ près.

**4.** On choisit à présent un échantillon de $n$ vaches dans cette région, $n$ étant un entier naturel non nul. On admet que l'on peut assimiler ce choix à un tirage avec remise.


Déterminer la valeur minimale de $n$ pour que la probabilité qu'il y ait, dans l'échantillon, au moins une vache testée positive, soit supérieure ou égale à 0,99.

## EXERCICE 2 — 5 points

On considère la fonction $f$ définie sur l'intervalle $]0\,;\,+\infty[$ par

$$f(x) = (2 - \ln x) \times \ln x,$$

où ln désigne la fonction logarithme népérien.
On admet que la fonction $f$ est deux fois dérivable sur $]0\,;\,+\infty[$.
On note $C$ la courbe représentative de la fonction $f$ dans un repère orthogonal et $C'$ la courbe représentative de la fonction $f'$, fonction dérivée de la fonction $f$.
La **courbe $C'$** est donnée ci-dessous ainsi que son unique tangente horizontale (T).



**1.** Par lecture graphique, avec la précision que permet le tracé ci-dessus, donner :

**a.** le coefficient directeur de la tangente à $C$ au point d'abscisse 1.

**b.** le plus grand intervalle sur lequel la fonction $f$ est convexe.

**2.** **a.** Calculer la limite de la fonction $f$ en $+\infty$.

**b.** Calculer $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$. Interpréter graphiquement ce résultat.

**3.** Montrer que la courbe $C$ coupe l'axe des abscisses en deux points exactement dont on précisera les coordonnées.

**4.** **a.** Montrer que pour tout réel $x$ appartenant à $]0\,;\,+\infty[$, $\quad f'(x) = \dfrac{2(1-\ln x)}{x}$.

**b.** En déduire, en justifiant, le tableau de variations de la fonction $f$ sur $]0\,;\,+\infty[$.

**5.** On note $f''$ la dérivée seconde de $f$ et on admet que pour tout réel $x$ appartenant à $]0\,;\,+\infty[$, $f''(x) = \dfrac{2(\ln x - 2)}{x^2}$.

Déterminer par le calcul le plus grand intervalle sur lequel la fonction $f$ est convexe et préciser les coordonnées du point d'inflexion de la courbe $C$.

## EXERCICE 3 — 5 points

On considère la suite $(u_n)$ définie par : $\begin{cases} u_1 = \dfrac{1}{\text{e}} \\ u_{n+1} = \dfrac{1}{\text{e}}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)u_n \text{ pour tout entier } n \geqslant 1. \end{cases}$

**1.** Calculer les valeurs exactes de $u_2$ et $u_3$. On détaillera les calculs.

**2.** On considère une fonction écrite en langage Python qui, pour un entier naturel $n$ donné, affiche le terme $u_n$. Compléter les lignes $L_2$ et $L_4$ de ce programme.

| | |
|---|---|
| $L_1$ | `def suite(n):` |
| $L_2$ | `  ..................` |
| $L_3$ | `  for i in range(1, n):` |
| $L_4$ | `  u=..................` |
| $L_5$ | `return u` |

**3.** On admet que tous les termes de la suite $(u_n)$ sont strictement positifs.

**a.** Montrer que pour tout entier naturel $n$ non nul, on a : $1+\dfrac{1}{n} \leqslant \text{e}$.

**b.** En déduire que la suite $(u_n)$ est décroissante.

**c.** La suite $(u_n)$ est-elle convergente ? Justifier votre réponse.

**4.** **a.** Montrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul, on a : $\quad u_n = \dfrac{n}{\text{e}^n}$.

**b.** En déduire, si elle existe, la limite de la suite $(u_n)$.

## EXERCICE 4 — 5 points

*Cet exercice est un questionnaire à choix multiples.*
*Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Une réponse exacte rapporte un point. Une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse à une question ne rapporte ni n'enlève de point. Pour répondre, indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre de la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.*

L'espace est rapporté à un repère orthonormé $\left(O\,;\,\vec{\imath}\,,\,\vec{\jmath}\,,\,\vec{k}\right)$.

On considère :
les points A$(-1\,;\,-2\,;\,3)$, B$(1\,;\,-2\,;\,7)$ et C$(1\,;\,0\,;\,2)$ ;
la droite $\Delta$ de représentation paramétrique : $\begin{cases} x = 1-t \\ y = 2 \\ z = -4+3t \end{cases}$, où $t \in \mathbb{R}$ ;
le plan $\mathscr{P}$ d'équation cartésienne : $3x+2y+z-4=0$ ;
le plan $\mathscr{Q}$ d'équation cartésienne : $-6x-4y-2z+7=0$.

**1.** Lequel des points suivants appartient au plan $\mathscr{P}$ ?

**a.** $R(1\,;\,-3\,;\,1)$ ; **b.** $S(1\,;\,2\,;\,-1)$ ; **c.** $T(1\,;\,0\,;\,1)$ ; **d.** $U(2\,;\,-1\,;\,1)$.

**2.** Le triangle ABC est :

**a.** équilatéral ; **b.** rectangle isocèle ;
**c.** isocèle non rectangle ; **d.** rectangle non isocèle.

**3.** La droite $\Delta$ est :

**a.** orthogonale au plan $\mathscr{P}$ ; **b.** sécante au plan $\mathscr{P}$ ;
**c.** incluse dans le plan $\mathscr{P}$ ; **d.** strictement parallèle au plan $\mathscr{P}$.

**4.** On donne le produit scalaire $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC} = 20$.
Une mesure au degré près de l'angle $\widehat{ABC}$ est :

**a.** $34°$ ; **b.** $120°$ ; **c.** $90°$ ; **d.** $0°$.

**5.** L'intersection des plans $\mathscr{P}$ et $\mathscr{Q}$ est :

**a.** un plan ; **b.** l'ensemble vide ;
**c.** une droite ; **d.** réduite à un point.

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.